

แบบทดสอบเพื่อประเมินผลก่อน/หลังการอบรม เรื่อง การควบคุมวัณโรค

คำแนะนำ: โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงตัวเดียวแล้วทำเครื่องหมาย X ลงใน
กระดาษคำตอบเท่านั้น กรุณาอย่าขีดเขียนหรือทำเครื่องหมายใดๆ ลงในแบบทดสอบ
นี้ และโปรดคืนแบบทดสอบพร้อมกระดาษคำตอบทุกครั้ง

1. ข้อใดไม่ถูกต้อง

- ก. วัณโรคไม่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญแล้ว
- ข. การแพร่ระบาดของโรคเอดส์มีผลกระทบต่อสถานการณ์วัณโรคอย่างชัดเจน
- ค. คนหนุ่มสาวในประเทศไทยป่วยเป็นวัณโรคจำนวนมาก
- ง. จำนวนผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

2. ข้อใดไม่ถูกต้อง

- ก. ประเทศไทยติดอันดับประเทศที่มีปัญหาวัณโรคสูง
- ข. วัณโรคเป็นปัญหาจำกัดอยู่เฉพาะเขตชนบท
- ค. อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยวัณโรคสูงขึ้นส่วนใหญ่เนื่องจากการติดเชื้อเอดส์
- ง. คนไทยติดเชื้อวัณโรคถึงประมาณหนึ่งในสาม

3. องค์การอนามัยโลกประกาศให้วัณโรคเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องรีบจัดการทั่วโลกในปี พ.ศ. ไດ

- ก. พ.ศ. 2536
- ข. พ.ศ. 2539
- ค. พ.ศ. 2546
- ง. พ.ศ. 2549

4. กลยุทธ์ในการควบคุมวัณโรคในปัจจุบัน คือข้อใด

- ก. วัคซีน BCG
- ข. DOTS
- ค. การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก
- ง. การให้สุขศึกษารายบุคคลอย่างเข้มข้น

5. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของ DOTS

- ก. การตอบสนองเชิงนโยบาย
- ข. DOT
- ค. ยาวัณโรค
- ง. การวินิจฉัยโดยเอกซเรย์ปอด

6. เป้าหมายอัตราการรักษาหายของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อ (New smear-positive) คือเท่าไร

- ก. อย่างน้อยร้อยละ 70
- ข. อย่างน้อยร้อยละ 80
- ค. อย่างน้อยร้อยละ 85
- ง. อย่างน้อยร้อยละ 95

7. ข้อใดถูก

- ก. การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกสำคัญกว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษา
- ข. ผู้ป่วยวัณโรคเด็กเป็นแหล่งสำคัญของการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค
- ค. ต้องบรรลุปเป้าหมายอัตราการรักษาหายก่อนจะขยายการค้นหาผู้ป่วยต่อไป
- ง. ผู้ป่วยวัณโรคนอกปอดมักแพร่กระจายเชื้อวัณโรคได้ดี

8. หากต้องการควบคุมวัณโรค ผู้ป่วยวัณโรคประเภทใดมีความสำคัญที่สุด (Top priority)

- ก. ผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ (Smear-positive)
- ข. ผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะไม่พบเชื้อ (Smear-negative)
- ค. ผู้ป่วยวัณโรคนอกปอด
- ง. ผู้ป่วยวัณโรคเด็ก

9. ผู้ป่วยวัณโรคเสมหะบวก (Smear-positive) 1 รายหากไม่ได้รับการรักษา จะสามารถแพร่กระจายเชื้อให้บุคคลสัมผัสใกล้ชิดติดเชื้อวัณโรคได้ปีละประมาณกี่คน

- ก. 1 – 2 คน
- ข. 5 – 10 คน
- ค. 10 – 15 คน
- ง. 20 – 30 คน

10. เชื้อวัณโรคคือยาหลายขนาน (Multi-drug resistant tuberculosis หรือ MDR TB) หมายถึงเชื้อวัณโรคที่ดื้อต่อยาในข้อใด

- ก. อย่างน้อย Z และ E
- ข. อย่างน้อย H และ R
- ค. H, R, Z และ E
- ง. ดื้อต่อยาวัณโรคทุกตัว

11. ข้อใดถือเป็นการวินิจฉัย "ผู้ป่วยวัณโรค (Definite case of tuberculosis)" ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก

- ก. ผู้ป่วยที่มีผลเอกซเรย์เข้าได้กับวัณโรคระยะลุกลาม
- ข. ผู้ป่วยที่มีผลเสมหะ AFB เป็นบวก 1 ครั้ง
- ค. ผู้ป่วยที่มีผลเสมหะ AFB เป็นบวก 2 ครั้ง
- ง. ผู้ป่วยที่มีผลเสมหะ AFB เป็นบวก 1 ครั้งร่วมกับมีผลเอกซเรย์ปอดที่เข้าได้กับวัณโรคปอดระยะลุกลาม (Active TB)

12. ข้อใดคือสูตรยาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อ (New smear-positive)

- ก. 2HRZE/4HR
- ข. 2HRZS/4HR
- ค. 2HRZE/6HE
- ง. ถูกทุกข้อ

กระดาษคำตอบสำหรับการทดสอบก่อน/หลังการอบรม เรื่อง การควบคุมวัณโรค

ชื่อ _____ ตำแหน่ง _____

สถานที่ปฏิบัติงาน _____ วันที่ _____

การทดสอบ [] ก่อน [] หลัง การอบรม

ข้อ	ก	ข	ค	ง
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				