ICD:10 Z 201 **แบบฟอร์มการคัดกรองผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรค (Guideline for tuberculosis Contact investigation)** TB No. ...../.....

ชื่อผู้บริการ..... อายุ.....ปี HN..... ผู้ป่วยวัณโรค HN..... วันที่เริ่มรักษา.....

การวินิจฉัยโรคของผู้ติดเชื้อวัณโรค (TB clinic) Y อาการทางคลินิก Y Sputum AFB : positive Y Sputum AFB : negative Y ตรวจทางรังสีทรวงอก

การคัดกรองอาการและผลการตรวจร่างกายเบื้องต้น

Y(OPD) อาการทางคลินิก ได้แก่ Y ไอเรื้อรัง > 2 wks. Yไอเป็นเลือด Y เสียงแหบ Y เจ็บหน้าอก Y มีไข้ Y เบื่ออาหาร Y น้ำหนักลดY อ่อนเพลีย

Yการตรวจร่างกาย.....

Y (TB clinic)CXR ก่อนพบแพทย์ทุกราย, **ผลการตรวจ**.....

Age	ประวัติสัมผัสผู้ป่วยวัณโรค	แนวทางปฏิบัติ/การรักษา
< 5 ปี	ผู้ป่วยวัณโรคมีผล Sputum AFB : Positive ไม่ต้องทำ Tuberculin Test (TT)	Y. INH 10 mg / kg / day นาน 3 เดือน และทำ TT ซ้ำ ผลการตรวจ TT :ซ้ำ Y TT ≤ 5 mm. ให้ off INH YTT > 5 mm. ให้ INH ครบ 12 เดือน
	ผู้ป่วยวัณโรคมีผล Sputum AFB : Negative ให้ทำ Tuberculin Test (TT) นัดพบแพทย์เพื่ออ่านผล 72 ชั่วโมง	
	Y Tuberculin Test (TT) ≥ 10 mm.	Y INH 10 mg/kg/day นาน 3 เดือน และทำ TT ซ้ำ ผลการตรวจ TT :ซ้ำ Y TT ≥.10 mm. ให้ INH ครบ 12 เดือน YTT <10 mm. ให้ off INH
	Y Tuberculin Test (TT) < 10 mm.	Y อายุ < 2 ปี ให้ INH 10 mg/kg/day นาน 12 เดือน Yอายุ ≥ 2 ปี ให้สังเกตอาการต่อ นัดตรวจ TT ซ้ำ หลัง 8 wks. ผลการตรวจ TT ซ้ำ Y TT ≥ 10 mm. ให้ INH 12 เดือน YTT < 10 mm. ให้สังเกตอาการต่อจนครบ 2 ปี
5-18 ปี	ผู้ป่วยวัณโรคมีผล Sputum AFB Positive ให้ทำ Tuberculin Test (TT) นัดพบแพทย์เพื่ออ่านผล 72 ชั่วโมง	
	Y Tuberculin Test (TT) ≥ 15 mm.	YINH 10 mg/kg/day นาน 9 เดือน
	Y Tuberculin Test (TT) 10-14 มม.	Yนัดทำ TT ซ้ำหลัง 8 wks. หาก Y TT ≥ 10 mm. ให้ INH 9 เดือน YTT < 10 mm. ให้สังเกตอาการต่อ
	ผู้ป่วยวัณโรคมีผล Sputum AFB Negative ให้ทำ Tuberculin Test (TT) นัดพบแพทย์เพื่ออ่านผล 72 ชั่วโมง	
	Y Tuberculin Test (TT) ≥ 15 มม.	YINH 10 mg/kg/day นาน 9 เดือน
	Y Tuberculin Test (TT)< 15 มม.	Yนัดทำ TT ซ้ำหลัง 8 wks. หากY TT ≥ 15 mm. ให้ INH 9 เดือน YTT < 15 mm. ให้สังเกตอาการต่อ

แบบฟอร์มการคัดกรองผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรค (Guideline for tuberculosis Contact investigation)

ชื่อผู้รับบริการ..... อายุ.....ปี HN..... ผู้ป่วยวัณโรค HN..... วันที่เริ่มรักษา.....

การวินิจฉัยโรคของผู้ติดเชื้อวัณโรค (TB clinic) Y อาการทางคลินิก Y Sputum AFB : positive Y Sputum AFB : negative Y ตรวจทางรังสีทรวงอก

การคัดกรองอาการและผลการตรวจร่างกายเบื้องต้น

Y(OPD)อาการทางคลินิก ได้แก่ Y ไอเรื้อรัง > 2 wks. Yไอเป็นเลือด Y เสียงแหบ Y เจ็บหน้าอก Y มีไข้ Y เบื่ออาหาร Y น้ำหนักลดY อ่อนเพลีย

Yการตรวจร่างกาย.....

Y (TB clinic)CXR ก่อนพบแพทย์ทุกราย, **ผลการตรวจ**.....

Age	ประวัติสัมผัสผู้ป่วยวัณโรค	แนวทางปฏิบัติ/การรักษา
< 5 ปี	ผู้ป่วยวัณโรคมีผล Sputum AFB : Positive ไม่ต้องทำ Tuberculin Test (TT)	Y. INH 10 mg / kg / day นาน 3 เดือน และทำ TT ซ้ำ ผลการตรวจ TT :ซ้ำ Y TT ≤ 5 mm. ให้ off INH YTT > 5 mm. ให้ INH ครบ 12 เดือน
	ผู้ป่วยวัณโรคมีผล Sputum AFB : Negative ให้ทำ Tuberculin Test (TT) นัดพบแพทย์เพื่ออ่านผล 72 ชั่วโมง	
	Y Tuberculin Test (TT) ≥ 10 mm.	Y INH 10 mg/kg/day นาน 3 เดือน และทำ TT ซ้ำ ผลการตรวจ TT :ซ้ำ Y TT ≥.10 mm. ให้ INH ครบ 12 เดือน YTT <10 mm. ให้ off INH
	Y Tuberculin Test (TT) < 10 mm.	Y อายุ < 2 ปี ให้ INH 10 mg/kg/day นาน 12 เดือน Yอายุ ≥ 2 ปี ให้สังเกตอาการต่อ นัดตรวจ TT ซ้ำ หลัง 8 wks. ผลการตรวจ TT ซ้ำ Y TT ≥ 10 mm. ให้ INH 12 เดือน YTT < 10 mm. ให้สังเกตอาการต่อจนครบ 2 ปี
5-18 ปี	ผู้ป่วยวัณโรคมีผล Sputum AFB Positive ให้ทำ Tuberculin Test (TT) นัดพบแพทย์เพื่ออ่านผล 72 ชั่วโมง	
	Y Tuberculin Test (TT) ≥ 15 mm.	YINH 10 mg/kg/day นาน 9 เดือน
	Y Tuberculin Test (TT) 10-14 มม.	Yนัดทำ TT ซ้ำหลัง 8 wks. หาก Y TT ≥ 10 mm. ให้ INH 9 เดือน YTT < 10 mm. ให้สังเกตอาการต่อ
	ผู้ป่วยวัณโรคมีผล Sputum AFB Negative ให้ทำ Tuberculin Test (TT) นัดพบแพทย์เพื่ออ่านผล 72 ชั่วโมง	
	Y Tuberculin Test (TT) ≥ 15 มม.	YINH 10 mg/kg/day นาน 9 เดือน
	Y Tuberculin Test (TT)< 15 มม.	Yนัดทำ TT ซ้ำหลัง 8 wks. หากY TT ≥ 15 mm. ให้ INH 9 เดือน YTT < 15 mm. ให้สังเกตอาการต่อ

วันที่มารับบริการ	วันนัดครั้งต่อไป	ผลการตรวจ/การรักษา

วันที่มารับบริการ	วันนัดครั้งต่อไป	ผลการตรวจ/การรักษา